

Empfehlungen im Umgang mit präoperativ und präanästhesiologisch bestehenden Dauermedikamenten – Analgetika, Lunge, Hormone

Substanz	Empfehlung	Begründung
Analgetika		
Opiate	fortführen	Entzug, postoperative Analgesie planen.
Buprenorphin	fortführen	
NSAR	fortführen	
Lunge		
Beta-Agonisten	fortführen	Bronchodilatation, Nebenwirkung Tachykardie, Asthma-Inhaler mit in den OP
Hormone		
Schilddrüsenhormone	fortführen	Kontrolle der Laborwerte bei symptomatischer Klinik oder unklarer Hormonsubstitution

Aussetzen: am OP-Tag morgens nicht verordnen, bei komplikationslosem Verlauf abends nach Plan.

Fortführen: nach Plan

Pausieren: angegebene Einnahmepause vor der Anästhesie; postoperatives Ansetzen nach individueller Entscheidung

Der Umgang mit präoperativ verordneten Dauermedikamenten und die Empfehlungen werden teilweise je nach Zugehörigkeit der Fachgesellschaften unterschiedlich bewertet.

Quelle: Arzneiverordnung in der Praxis (AVP): Welche Medikamente sollen vor Anästhesien abgesetzt werden? Band 46, Heft 1–2. März 2019.