

Empfehlungen im Umgang mit präoperativ und präanästhesiologisch bestehenden Dauermedikamenten – Gerinnungshemmer

Substanz	Empfehlung	Begründung
Phenprocoumon	pausieren 7 Tage	Blutungsgefahr (INR-Kontrolle)
ASS 100 mg	fortführen	Ausnahme: neurochirurgische Operation
Apixaban	pausieren 4 Tage	Blutungsgefahr
Clopidogrel	pausieren 7 Tage	
Dabigatran	pausieren 4 Tage	
Rivaroxaban	pausieren 3 Tage	
Ticagrelor	pausieren 5 Tage	
Edoxaban	pausieren 4 Tage	

Aussetzen: am OP-Tag morgens nicht verordnen, bei komplikationslosem Verlauf abends nach Plan.

Fortführen: nach Plan

Pausieren: angegebene Einnahmepause vor der Anästhesie; postoperatives Ansetzen nach individueller Entscheidung

Der Umgang mit präoperativ verordneten Dauermedikamenten und die Empfehlungen werden teilweise je nach Zugehörigkeit der Fachgesellschaften unterschiedlich bewertet.

Quelle: Arzneiverordnung in der Praxis (AVP): Welche Medikamente sollen vor Anästhesien abgesetzt werden? Band 46, Heft 1–2. März 2019.