

Programmierte Untersuchungen im Rahmen der Nachsorge bei kolorektalem Karzinom UICC II oder III

Untersuchung	Monate										
	3	6	9	12	15	18	21	24	36	48	60
Anamnese, körperliche Untersuchung, CEA		x		x		x		x	x	x	x
Koloskopie		x *		x **							x **
Abdomensonografie ***		x		x		x		x	x	x	x
Sigmoidoskopie (Rektoskopie) ****		x		x		x		x			
Spiralcomputertomografie x	x										
Röntgen Thorax *****				x				x	x	x	x

* Wenn keine vollständige Koloskopie präoperativ erfolgt ist.

** Bei unauffälligem Befund (kein Adenom, kein Karzinom) nächste Koloskopie nach 5 Jahren

*** Eine Metaanalyse ergab einen Vorteil für ein bildgebendes Verfahren zum Nachweis von Lebermetastasen in der Nachsorge. Aus diesem Grund entschied sich die Expertenkommission, das einfachste und kostengünstigste Verfahren anzuwenden.

**** Nur beim Rektumkarzinom ohne neoadjuvante oder adjuvante Radiochemotherapie

***** Nur beim Rektumkarzinom kann jährlich eine Röntgen-Thoraxuntersuchung durchgeführt werden.

X Nur beim Rektumkarzinom 3 Monate nach Abschluss der tumorspezifischen Therapie (Operation bzw. adjuvante Strahlen-/Chemotherapie) als Ausgangsbefund

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom. AWMF-Leitlinie 021-007OL, Stand 2017.