

Oxcarbazepin (Apydan®, Trileptal®)

Bruksområde

Oxcarbazepin brukes til behandling av epilepsi og smertetilstander.

Dosering

Oxcarbazepin doseres vanligvis 2 ganger daglig.

Opptopping

For å minske forekomst av bivirkninger i startfasen, trappes oxcarbazepin opp i løpet av 7-10 dager. Hvis man skal skifte fra karbamazepin til oxcarbazepin, kan det gjøres uten opptopping.

Bivirkninger

Følgende bivirkninger kan av og til opptre: dobbeltsyn, usikker gange, tretthet, hodepine og hudutslett. Forekomsten av hudutslett er betydelig sjeldnere enn ved karbamazepin (Tegretol®, Trimonil®).

Overfølsomhet i form av utslett kan bety, at man må skifte til et annet preparat.

Oxcarbazepin kan være fosterskadelig. Kvinner i fruktbar alder bør derfor bruke adekvat prevensjon.

Bruk av oxcarbazepin sammen med andre medisiner

Samtidig behandling med andre medisiner gir sjelden problemer, men oxcarbazepin kan være årsak til P-pillesvikt.

DOSERINGEN ER INDIVIDUELL OG VARIERER MED ALDER OG KJØNN.

Doserings skjema for med.: _____ Tablettstyrke: _____ mg

Dag/uke	Morgen	Middag	Kveld

Vennligst se baksiden av arket

MEDIKAMENTELL BEHANDLING

Noen praktiske råd

Tidspunkt

Det er ikke likegyldig når medisinen tas. For å oppnå ønsket virkning og en stabil konsentrasjon av medisinen i blodet, er det viktig å ta den på omtrent samme tid hver dag. Skal du ta medisin flere ganger daglig, er det viktig å fordele dosen utover dagen. Hvis du f.eks. skal ta medisin to ganger daglig, bør du ta den med tolv timers mellomrom, f.eks. kl. 08.00 og 20.00. Gjør det gjerne til en vane å ta medisinen i forbindelse med andre dagligdagse gjøremål, som f.eks. måltider eller tannpuss.

Ved oppkast eller diaré

Ved oppkast innen en halv time etter inntak av medisinen, er det nødvendig å ta en ny dose. Ved diaré er det ikke nødvendig å ta en ny dose, da medisinen normalt vil rekke å tas opp i tarmen.

Doseringseske

Når man tar medisiner daglig, kan det ofte være vanskelig å huske om man har tatt tablettene eller ikke. Derfor er det en fordel å bruke doseringsesker for en uke. Det gir mulighet til å kontrollere om tablettene er tatt eller ikke.

Glemt medisin?

Hvis man har glemt å ta medisinen til vanlig tid, skal man ta den glemte dosen så snart man oppdager det, eller sammen med neste dose. Det kan gi bivirkninger, men disse er forbigående. Kontakt legen hvis du er i tvil.

Hodepinedagbok

Mange mennesker har vanskelig for å huske, dette gjelder også hodepinepasienter. En hodepinedagbok er et nyttig middel for å følge tilstanden over tid. Medisinens effekt måles først og fremst i forhold til hodepinens hyppighet, varighet og styrke, men også mengden av medisiner du tar. Husk derfor å føre dagboken nøyaktig og vise den til legen ved hver kontroll.

Vedr. refusjon av legemidler på hvit resept

I følge Lov om folketrygd § 5-22 *Bidrag til spesielle formål* kan trygden yte bidrag til dekning av utgifter til legemidler på hvit resept. For kalenderåret 2018 dekkes 90 % av utgifter som overstiger kr. 1858. Kvitteringer sendes samlet til HELFO.

Egne regler gjelder for pasienter med kreftsykdom. I slike tilfeller vil det være mulig å søke om full refusjon.

Vi gjør oppmerksom på at refusjonsordningen for legemidler på hvit resept kommer i tillegg til refusjonsordningen for legemidler på blå resept. For denne ordningen er det slik at frikort vil bli utstedt automatisk dersom det kan dokumenteres utgifter til egenandel som overskrider maksimumsbeløpet på kr 2258.