

Tri- und tetrazyklische Antidepressiva (TZA) – nichtselektive Monoamin-Rückaufnahme-Inhibitoren (NSMRI)

Wirkstoff (Wirkstoffgruppe)	Dosierung		Plasmaspiegel	Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)
	Anfangsdosis (mg/Tag)	Standard-Tagesdosis (mg/Tag)	Serumkonzentration (Talspiegel von Medikamenteneinnahme) [ng/ml]	Empfehlungsgrad für TDM
Amitriptylin	25–50	75–300	80–200*	stark empfohlen
Amitriptylinoxid	30–60	75–300	–	–
Clomipramin	25–50	75–250	230–450*	stark empfohlen
Desipramin	25–50	75–250	100–300	empfohlen
Imipramin	25–50	75–300	175–300*	stark empfohlen
Maprotilin	25–50	75–225	75–130	empfohlen
Nortriptylin	25–50	50–200	70–170	stark empfohlen
Trimipramin	25–50	75–300	150–300	empfohlen

Quellen:

DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BPtK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (Hrsg.) für die Leitliniengruppe Unipolare Depression. S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression, 2. Auflage. 2015. Stand 2. Dezember 2015; AWMF-Register-Nr. nvl-005.

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ). Empfehlungen zur Therapie der Depression (Arzneiverordnung in der Praxis). Köln 2006, Online-Ressource, letzter Zugriff 30.01.2018.