

Selektive Serotonin-/Noradrenalin-Rückaufnahme-Inhibitoren (SNRI)

Wirkstoff (Wirkstoffgruppe)	Dosierung		Plasmaspiegel	Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)
	Anfangsdosis (mg/Tag)	Standard-Tagesdosis (mg/Tag)	Serumkonzentration (Talspiegel von Medikamenteneinnahme) [ng/ml]	Empfehlungsgrad für TDM
Venlafaxin	37,5–75	75–225	100–400*	empfohlen
Duloxetin	30–60	60	30–120	empfohlen

Quellen:

DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BPTK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (Hrsg.) für die Leitliniengruppe Unipolare Depression. S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression, 2. Auflage. 2015. Stand 2. Dezember 2015; AWMF-Register-Nr. nvl-005.

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ). Empfehlungen zur Therapie der Depression (Arzneiverordnung in der Praxis). Köln 2006, Online-Ressource, letzter Zugriff 30.01.2018.